

EPRINSA®
Eplerenone
tablets 25mg & 50mg

اپرینسا®
اپلرنون
قرص های ۲۵ و ۵۰ میلی گرمی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ از مصرف آن در سایر موارد و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

موارد مصرف:

در بزرگسالان اپلرنون به تنهایی یا در کنار داروهای دیگر برای کاهش فشارخون بالا تجویز می شود.
این دارو در بزرگسالان دچار نارسایی قلبی در موارد زیر تجویز می شود:
- برای جلوگیری از وخیم تر شدن نارسایی قلبی
- برای جلوگیری از مرگ ناشی از نارسایی قلبی
- برای کاهش خطر بستری شدن به دلیل نارسایی قلبی

راهنمایی های عمومی:

در موارد زیر این دارو منع مصرف دارد:
- حساسیت به اپلرنون یا اجزای دیگر این دارو
- بالا بودن سطح پتاسیم خون
- استفاده از سایر داروهای دیورتیک نگهدارنده پتاسیم (تریامترن، اسپرونولاکتون، آمیلوراید)
- نارسایی شدید کبدی
- نارسایی قلبی به همراه نارسایی شدید کلیوی
- مصرف داروهای مداخله گر با این دارو مانند: داروهای ضد ویروس درمان ایدز، کلاریترومایسین، کتوکونازول یا ایتراکونازول، نفازودون، مکمل های پتاسیم

موارد احتیاط:

در صورت وجود موارد زیر، قبل از مصرف اپلرنون با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:
- در صورتی که مشکل کبدی یا کلیوی دارید.
- در صورتی که مبتلا به دیابت هستید.
- در صورتی که داروی لیتیم مصرف می کنید.
- در صورتی که از مکمل های پتاسیم یا جانشین های نمک که حاوی پتاسیم هستند استفاده می کنید.
در زمان مصرف این دارو ممکن است احساس گیجی کنید، در صورت بروز این حالت موضوع را به پزشکتان اطلاع داده و از رانندگی و یا کار با ماشین آلات سنگین خودداری کنید.

تداخلات دارویی:

بعضی از داروها روند تاثیر اپلرنون در بدن را تغییر می دهد. در صورت مصرف هر یک از موارد زیر به پزشکتان اطلاع دهید:
- کتوکونازول، ایتراکونازول، فلوکونازول
- وراپامیل یا دیلتیازم
- دیگوکسین یا آمیودارون
- مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین مثل کاپتوپریل و انالپریل و ..
- مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین مانند لوزارتان، والزارتان و ..
- دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم مانند تریامترن، اسپرونولاکتون، آمیلوراید
- مکمل های حاوی پتاسیم و انواعی از مکمل های گیاهی مثل عصاره قاصدک
- داروهای ضد ویروس ایدز
- آنتی بیوتیک های اریترومایسین، کلاریترومایسین و ریفامایسین
- لیتیم
- نفازودون و علف چای یا هوفاریقون
- کاربامازپین، فنی توئین، فنوباریتال
- داروهای ضد درد غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن، ناپروکسن و ...

مصرف در بارداری و شیردهی

- بارداری: مصرف این دارو در بارداری باید با دستور پزشک و پس از بررسی اثرات سوء و مزایای دارو انجام شود.
شیردهی: این دارو در زمان شیردهی فقط در صورت تجویز پزشک مصرف شود.

روش مصرف دارو:

روش دقیق مصرف این دارو را پزشک شما مشخص می کند. دستورات پزشک و داروساز خود را به بهترین شکل اجرا کنید. میزان مصرف دارو به میزان پتاسیم خون شما بستگی دارد.
قرص اپلرنون را می توان همراه با غذا و یا با شکم خالی مصرف کرد. دارو را با یک لیوان آب و بدون جویدن مصرف کنید. مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

-این دارو ممکن است سردرد ایجاد کند.
-شایع ترین عوارض این دارو مربوط به افزایش میزان پتاسیم خون است؛ مانند بی نظمی ضربان قلب، ضعف عضلانی و حس ناخوشی.
-احتمال بروز علایم حساسیت مانند کهیر، قرمزی، خارش، تورم، احساس تنگی نفس.
-اسهال، استفراغ.
-تورم دست یا پا.
-مشکل در دفع ادرار یا تغییر در میزان آن.
-احتمال بروز درد قلبی و یا انفارکتوس قلبی با این دارو وجود دارد.
-در صورت بروز این عوارض به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. این دارو ممکن است نتیجه آزمایش خون را تغییر دهد.

در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده:

در صورت مصرف بیش از اندازه سریع به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید و به مراکز درمانی مراجعه کنید.

در صورت فراموش کردن یک دوز:

در صورتی که مصرف یک دوز دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن دارو را مصرف کنید. اگر تقریباً نزدیک زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است، دوز فراموش شده را مصرف نکنید و دوز بعدی را در زمان اصلی مصرف کرده و مصرف دارو را ادامه دهید. از دوبرابر کردن دوز خودداری کنید.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.

شرکت دارویی اکتوورکو، کرج، ایران

