

Haydine®
Desloratadine
F.C. tablet 5 mg

هیدین®
دس لوراتادین
قرص روکش دار ۵ میلی گرمی

اطلاعات این راهنما را قبل از مصرف دارو و با هر بار مصرف بسته جدید به صورت دقیق مطالعه کنید؛ زیرا ممکن است اطلاعات جدیدی به آن اضافه شده باشد. این اطلاعات جایگزین مشورت با پزشک درباره وضعیت بیماری و یا داروهای مصرفی شما نیست. دس لوراتادین متعلق به نسل دوم آنتی هیستامین ها می باشد و آنتاگونیست گیرنده H1 در مغز است. این دارو در درمان انواع حساسیت مانند رینیت آلرژیک و کهیر مزمن استفاده می شود.

موارد مصرف:

قرص هیدین® جهت کنترل موارد زیر تجویز می شود:
- رینیت آلرژیک (عطسه، آبریزش و خارش بینی، خارش سقف دهان (کام)، خارش، قرمزی یا آبریزش چشم)؛
- کهیر (خارش طولانی مدت و بثورات جلدی).

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف دارو، موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:
• سابقه و یا ابتلا به هر گونه بیماری؛
• سابقه هر نوع حساسیت به این دارو یا مواد تشکیل دهنده آن؛
• در صورت ابتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی؛
• در صورتی که باردار هستید یا قصد بارداری دارید؛
• در صورتی که در دوران شیردهی هستید یا قصد شیردهی دارید؛
• در صورت مصرف هر گونه داروی نسخه ای، بدون نسخه، داروهای گیاهی، ویتامین و مکمل ها.

مقدار و نحوه مصرف:

• دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید.
• دارو را می توانید همراه با غذا یا بدون غذا مصرف کنید.
• در صورت مصرف دارو بیش از دوز درمانی تجویز شده به پزشک خود و یا نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنید.
• در صورت فراموشی مصرف یک دوز از دارو، به محض به یاد آوردن فوراً آن را مصرف کنید.
• در صورتی که تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده باشد، از دو برابر کردن دوز خودداری کرده و دوز بعدی را طبق روال تجویز دارو ادامه دهید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

• در صورت حساسیت به دس لوراتادین یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو و یا لوراتادین، از مصرف این دارو خودداری فرمایید.

هشدارها و موارد احتیاط:

• در صورت ابتلا به اختلال عملکرد کلیوی، پیش از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
• در صورت سابقه پزشکی یا خانوادگی تشنج، پیش از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

• در صورتی که باردار هستید و یا قصد بارداری دارید، پیش از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود.
• در صورتی که در دوران شیردهی هستید یا قصد شیردهی دارید، از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی اثرات ناخواسته نیز شود؛ اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر مصرف دارو را متوقف کرده و با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

• عوارض بسیار شایع (بیشتر از یک نفر در ۱۰ نفر):

- سردرد
- تحریک پذیری
- اسهال
- عفونت دستگاه تنفسی فوقانی
- سرفه
- تب

• عوارض شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰ نفر):

- خواب آلودگی
- بی خوابی
- خستگی
- سرگیجه
- اریتم و قرمزی پوست
- بثورات جلدی برجسته
- بی اشتها بی عصبی و تهوع
- افزایش اشتها
- خشکی دهان
- درد عضلانی
- درد قاعدگی

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر، پیش از شروع درمان با قرص هیدین® با پزشک خود مشورت نمایید:

- کتوکونازول
- اریترومايسين
- آزیترومایسین
- آنتی هیستامین ها
- فلوکستین
- سایمتیدین

نحوه نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور، رطوبت، گرما و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه خودداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

شرکت دارویی اکتورکو، کرج، ایران

