

MOTILOVER®
Domperidone
F.C. Tablet 10 mg

موتیلوور®
دومپریدون
قرص روکشدار ۱۰ میلی گرمی

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد ذیل با پزشک خود مشورت نمایید:

- حساسیت به دومپریدون
- در صورت حاملگی و شیردهی
- در صورت مصرف همزمان با سایر داروها بخصوص بروموکریپتین، داروهای ضد درد مخدر، کتوکونازول، اریترومايسين، ریتوناویر
- در صورت سابقه و ابتلا به هر نوع بیماری بخصوص بیماریهای کبدی، کلیوی، بیماریهای قلبی و ایدز

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری: مطالعات کافی بر روی انسان انجام نشده است. مصرف این دارو در این دوران تنها زمانی مجاز است که توسط پزشک، نیاز به آن کاملاً محرز شده باشد و فواید حاصله به طور کامل بر زیان احتمالی آن بر جنین برتری داشته باشد.

شیر دهی: در مقادیر کم در شیر ترشح میشود، به علت احتمال بروز عوارض جانبی ناخواسته روی کودک شیرخوار، میبایست مصرف در این دوران در برابر مضرات آن سنجیده شود.

احتیاطات:

نشانه های بیماری در طول ۳ الی ۴ روز بعد از مصرف دارو بهبود می یابند. از مصرف این دارو به مدت بیش از هفت روز بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید.

- بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود.

- در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت از دارو، به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده آن را میل کنید. اما اگر تقریباً زمان نوبت بعدی رسیده است، نوبت فراموش شده را رها کرده، طبق برنامه منظم خود عمل کنید و مقدار مصرف دارو را دو برابر نکنید.

- در صورت بروز تشنج، حرکات غیر ارادی صورت و یا دست و پا، لرزش زیاد، گرفتگی و سفتی شدید ماهیچه ها، واکنشهای حساسیتی شدید که بلافاصله پس از مصرف دارو اتفاق می افتد و شامل علائمی مانند تحریکات پوستی، کبیر، خارش، سرخ شدن چهره، غش، ورم صورت و مشکل در تنفس، مصرف دارو را قطع نموده سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید.

- در صورت نیاز به هر گونه تست آزمایشگاهی پزشک و پرسنل آزمایشگاه را از مصرف این دارو مطلع کنید. مصرف این دارو ممکن است بر روی پاسخ تستهای آزمایشگاهی مانند آزمایش خون و آزمایشهای بررسی عملکرد کبدی اثر بگذارد.

- این دارو به عنوان ضد تهوع در درمان کوتاه مدت تهوع و استفراغ با دلایل مختلف استفاده میشود و جهت حالت تهوع و استفراغ مزمن همچنین برای پروفیلاکسی روتین استفراغ بعد از عمل جراحی مناسب نیست.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند ولی مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

درمان تهوع و استفراغ:

بزرگسالان: به صورت خوراکی ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم سه یا چهار مرتبه در روز و حداکثر میزان مصرف روزانه ۸۰ میلی گرم می باشد.

کودکان: مقدار مصرف توسط پزشک تعیین میگردد.

درمان علامتی سوء هاضمه (بدون زخم):

۱۰ تا ۲۰ میلی گرم سه بار در روز، ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل از غذا و ۱ عدد قبل از خواب.

توجه: طول مدت اولین دوره درمان نباید از ۲-۴ هفته تجاوز کند.

درمان میگرن:

میزان ۲۰ میلی گرم به فاصله هر ۴ ساعت یکبار تا حداکثر میزان ۸۰ میلی گرم در روز، می تواند مصرف شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمیشود ولی در صورت بروز هر یک از علائم زیر با پزشک مشورت شود:

- عوارض شایع با احتمال بروز حداکثر ۱ نفر از هر ۱۰ نفر: خشکی دهان
- عوارض غیر شایع با احتمال بروز حداکثر ۱ نفر از هر ۱۰۰ نفر: اضطراب، عدم تمایل و یا کاهش میل جنسی، سردرد، بیخوابی، اسهال، راش و خارش پوستی، حساس شدن و درد سینه ها، خروج شیر از پستانها، احساس ضعف عمومی
- عوارضی با احتمال وقوع نامعلوم: کبیر، عصبی شدن و آشفتگی، احساس سرگیجه، بیماریهای حرکتی چشم، ناتوانی در دفع ادرار، تورم پستانها (حتی در مردها)، توقف عادت ماهیانه

در صورت بروز عوارض قلبی مانند آریتمی بلافاصله مصرف دومپریدون را متوقف کرده و پزشک خود را مطلع نمایید. این امر بخصوص در بیماران بالای ۶۰ سال که دوزهای بالای ۳۰ میلیگرم در روز مصرف میکنند حائز اهمیت است. دومپریدون میبایست در کمترین مقدار موثر دارو در کودکان و بزرگسالان تجویز شود.

مسمومیت و درمان:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

_ دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

_ دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

_ از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت کارخانه داروسازی اکتوورکو، ایران - کرج، شهرک صنعتی بهارستان

