

Rytcard®
Flecainide acetate
Scored F.C. tablet 100mg

ریتکارد®
فلکائینید استات
قرص روکشدار خط دار ۱۰۰ میلی گرم

اطلاعات این راهنما را قبل از مصرف و با هر بار مصرف بسته جدید به صورت دقیق مطالعه کنید؛ زیرا ممکن است اطلاعات جدیدی به آن اضافه شده باشد. این اطلاعات جایگزین مشورت با پزشک درباره وضعیت بیماری و یا داروهای مصرفی شما نیست. داروی ریتکارد® متعلق به دسته داروهای ضد آریتمی است که با اصلاح ضربان نامنظم قلب، باعث بازگشت قلب به ضربان طبیعی خود می شود.

موارد مصرف:

ریتکارد® در درمان موارد زیر به کار می رود:

- آریتمی (ضربان نامنظم قلب مانند سندرم ولف پارکینسون وایت)؛
- تاکی کاردی (ضربان سریع قلب)؛
- فیبریلاسیون دهلیزی (انقباضات سریع ماهیچه های قلب).

ریتکارد® برای پیشگیری در موارد زیر تجویز می شود:

- تاکی کاردی فوق بطنی حمله ای (PSVT)، از جمله AVNRT، AVRT و سایر تاکی کاردی های فوق بطنی با مکانیسم های نامشخص همراه با علائم ناتوان کننده؛
- فیبریلاسیون/فلوتر دهلیزی حمله ای (PAF) همراه با علائم ناتوان کننده؛
- آریتمی های بطنی، مانند تاکی کاردی بطنی پایدار (stained VT).

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو، موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

- در صورت بالا یا پایین بودن سطح املاح (مانند پتاسیم) در خون؛
- در صورت ابتلا به مشکلات کبدی و کلیوی؛
- در صورت استفاده از ضربان ساز؛
- در صورت سابقه یا ابتلا به نارسایی قلبی یا انواع دیگر بیماری های قلبی؛
- در صورت سابقه حمله قلبی؛
- در صورت سابقه یا ابتلا به آنژین قلبی؛
- در صورتی که پس از جراحی، ضربان قلب سریع و نامنظم دارید.

مقدار و نحوه مصرف:

ریتکارد® را مطابق دستور پزشک مصرف نمایید. مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

- دوز معمول در بزرگسالان، ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز تا حداکثر ۴۰۰ میلی گرم در روز است.
- دوز مورد نیاز در برخی از بیماران، به ویژه افرادی که تاکی کاردی فوق بطنی دارند، ۵۰ میلی گرم دو بار در روز است.
- بیماران مسن و بیماران مبتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی ممکن است به دوز کمتری نیاز داشته باشند.
- دارو را می توانید همراه با غذا یا بدون غذا مصرف کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بارداری

- مصرف این دارو در دوره بارداری باید طبق نظر پزشک صورت گیرد. در صورتی که باردار هستید یا قصد بارداری دارید، با پزشک خود مشورت کنید.

شیردهی

- این دارو در شیر مادر ترشح می شود. در صورتی که در دوران شیردهی هستید یا قصد شیردهی دارید، با پزشک خود مشورت کنید.

موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به فلکائینید استات یا هر یک از ترکیبات دیگر این دارو؛
- در صورت ابتلا به نارسایی قلبی یا برخی از انواع اختلالات ریتم قلب؛
- در صورت ابتلا به بیماری دریچه قلب؛
- در صورت ابتلا به شوک قلبی؛
- در صورتی که مبتلا به یک اختلال قلبی به نام سندرم بروگادا هستید؛
- در صورت استفاده از داروهای ضد آریتمی کلاس ۱ مانند کینیدین و پروکائین آمید؛
- در صورتی که دچار عدم تعادل الکترولیت ها (املاح خون) هستید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی از اثرات ناخواسته نیز گردد؛ اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- عوارض بسیار شایع (بیشتر از یک نفر در ۱۰ نفر):
- ضربان نامنظم بطنی؛
- گیجی؛
- تاری دید و دیدن لکه.

عوارض شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰ نفر):

• کند یا تند شدن ضربان قلب؛ • نامنظم شدن ضربان قلب؛ • نارسایی قلبی؛ • درد قفسه سینه؛
• تورم؛ • گرگرفتگی؛ • غش (سنگوب)؛ • تعریق شدید؛ • بثورات پوستی؛ • درد شکم؛
• بی‌اشتهایی؛ • بی‌خوابی؛ • اسهال؛ • سوء هاضمه؛ • تهوع؛ • استفراغ؛ • اضطراب؛
• عدم توانایی کنترل و هماهنگی حرکات (آتاکسی)؛ • افسردگی؛ • خواب آلودگی؛ • خستگی؛ • سردرد؛
• بی‌حسی در یک یا چند اندام بدن؛ • بی‌خوابی؛ • کسالت؛ • سوزن سوزن شدن؛ • سرگیجه؛
• ضعف شدید؛ • لرزش؛ • دوبینی؛ • وزوز گوش؛ • تب.

عوارض غیر شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰۰ نفر):

• آنژین قلبی؛ • انسداد هدایت الکتریکی قلبی (بلوک دهلیزی-بطنی)؛ • افزایش فشار خون؛ • افت فشار خون؛
• ریزش مو؛ • التهاب پوستی؛ • خارش؛ • کهیر؛ • کاهش میل جنسی؛ • اختلال حس چشایی؛ • نفخ؛
• تورم لب‌ها؛ • تورم زبان؛ • خشکی دهان؛ • ناتوانی جنسی؛ • احتباس ادراری؛ • تغییر در تعداد سلول‌های خونی؛
• دیدن خواب‌های غیرعادی؛ • فراموشی؛ • بی‌تفاوتی و بی‌احساسی (آپاتی)؛ • تردید و گیجی؛ • سرخوشی؛
• اختلال عملکرد اعصاب محیطی (نوروپاتی)؛ • تشنج؛ • اختلال در گفتار؛ • حرکات ناگهانی؛ • درد و سفتی مفاصل؛
• درد عضلانی؛ • درد و سوزش چشم؛ • هراس از نور (فوتوفوبیا)؛ • حرکات سریع و کنترل نشده چشم (اختلال نیستاگموس)؛
• پر ادراری؛ • تغییر عملکرد کبد با یا بدون زرد شدن پوست یا چشم؛ • اسپاسم راه‌های هوایی؛
• التهاب ریه که علائم آن شامل تنگی نفس و سرفه می‌باشد.

عوارض نادر (کمتر از یک نفر در ۱۰۰۰ نفر):

• از دست دادن حافظه؛ • توهم؛ • حساسیت پوست به نور؛ • افزایش سطح آنتی‌بادی‌های خاصی که ممکن است باعث التهاب شود.

هشدارها و موارد احتیاط:

• از رانندگی، کار با ماشین‌آلات یا انجام هر کاری که نیاز به هوشیاری دارد، تا زمانی که متوجه نشدید ریتکارد® بر شما چه تأثیری می‌گذارد خودداری کنید. به این دلیل که فلکاتینید استات می‌تواند باعث تاری دید یا سرگیجه در برخی افراد شود.
• مصرف ریتکارد® در کودکان زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر، پیش از شروع درمان با پزشک خود مشورت نمایید:
• دیگوکسین (برای درمان نارسایی قلبی)؛
• برخی از داروهای اثرگذار بر قلب (مانند مهارکننده‌های بتا یا وراپامیل)؛
• سایر داروهای ضد آریتمی (مانند آمبودارون)؛
• داروهای ضد افسردگی (مانند فلوکستین، پاروکستین، میرتازاپین و ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای)؛
• داروهای ضد صرع (مانند لاکوزامید، فنی‌توئین، فنوباریتال و کاربامازپین)؛
• کلوزاپین (برای درمان بیماری‌های اعصاب)؛
• آنتی‌هیستامین‌هایی مانند هیدروکسی‌زین یا ترفنادین (برای درمان تب یونجه و آلرژی)؛
• کینین (برای درمان و پیشگیری از مالاریا)؛
• ریتوناویر (برای درمان ایدز)؛
• داروهای ادرار آور (مانند فوروزماید)؛
• سایمتیدین (برای التیام زخم گوارشی)؛
• بوپروپیون (برای کمک به ترک سیگار)؛
• تربینافین (داروی ضد قارچ)؛
• داروهای خوراکی بیماری‌ام‌اس (فینگولیمود، اوزانیمود، سیپونیمود)؛
• اندانسترون و دومپریدون؛
• مصرف تنباکو (سیگار و قلیان) که ممکن است اثربخشی درمانی فلکاتینید استات را کاهش دهد.

نحوه نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور، رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- از مصرف این دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه خودداری کنید.
- این دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

این دارو باید حتماً با تجویز پزشک مصرف شود. از در اختیار قرار دادن دارو برای آشنایان، حتی در صورتی که علائم مشابه شما را دارند خودداری کنید؛ زیرا ممکن است برای ایشان آسیب‌زا باشد.

شرکت دارویی اکتوورکو، کرج، ایران

References:

1- chrome-extension://efaidnbmninnbpcjpcjclefindmkaj/https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.3087.pdf

