

**Vizaract®**  
Sildenafil  
F.C. tablets 50 & 100 mg

**ویزارکت®**  
سیلدنافیل  
قرص روکشدار ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم

اطلاعات این راهنما را قبل از مصرف و با هر بار مصرف بسته جدید به صورت دقیق مطالعه کنید؛ زیرا ممکن است اطلاعات جدیدی به آن اضافه شده باشد. این اطلاعات جایگزین مشورت با پزشک درباره وضعیت بیماری و یا داروهای مصرفی شما نیست.

داروی ویزارکت® متعلق به دسته داروهای مهارکننده فسفودی استراز نوع ۵ (PDE5) است که با اتساع عروق خونی در آلت تناسلی و افزایش جریان خون در آن، باعث کمک به نعوظ و حفظ آن هنگام تحریک جنسی می شود.

#### موارد مصرف:

ویزارکت® در درمان اختلال نعوظ تجویز می شود.

#### راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو، موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:
- در صورت ابتلا به کم خونی داسی شکل (ناهنجاری گلبول های قرمز خون)، لوسمی (سرطان سلول های خونی) یا مولتیپل میلوما (سرطان مغز استخوان)؛
- در صورت غیرعادی بودن شکل آلت تناسلی یا ابتلا به بیماری پیرونی؛
- در صورت ابتلا به زخم معده یا اختلالات خونریزی دهنده (مانند هموفیلی)؛
- در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی یا کبدی؛
- در صورت ابتلا به بیماری انسداد ورید ریوی (POVD)؛
- در صورت مصرف داروهای مهارکننده پروتئاز (مانند داروهای HIV و هپاتیت C)؛
- در صورتی که به بیماری های قلبی-عروقی مبتلا هستید.

#### مقدار و نحوه مصرف:

- ویزارکت® را مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.
- دوز توصیه شده برای شروع، به طور معمول ۵۰ میلی گرم یک بار در روز است.
- ویزارکت® را حدود یک ساعت قبل از رابطه جنسی مصرف کنید.
- قرص را با یا بدون غذا، همراه با یک لیوان آب میل نمایید.
- در صورت مصرف این دارو بعد از یک وعده غذایی پرچرب، ممکن است شروع اثر آن کمی بیشتر طول بکشد.

#### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

ویزارکت® نباید توسط زنان مصرف شود.

#### موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به سیلدنافیل یا هر یک از ترکیبات دیگر این دارو؛
- در صورت ابتلا به بیماری شدید قلبی یا کبدی؛
- در صورت مصرف داروهای حاوی نیترات (مانند نیتروگلیسرین و ایزوسورباید دی نیترات)؛
- در صورت مصرف آمیل نیتریت؛
- در صورت مصرف داروی ریوسیگوات؛
- در صورت ابتلا به بیماری های ژنتیکی چشمی (مانند رتینیت پیگمنتوزا)؛
- در صورتی که سابقه از دست دادن ناگهانی بینایی ناشی از نوروپاتی ایسکمی قدامی غیر شریانی عصب بینایی (NAION) را داشته اید.

#### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی از اثرات ناخواسته نیز گردد؛ اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عوارض بسیار شایع (بیشتر از یک نفر در ۱۰ نفر):

- سردرد

عوارض شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰ نفر):

- حالت تهوع

- گرگرفتگی

- سوء هاضمه

- اختلال در ادراک رنگ ها

- تاری دید

- گرگفتگی بینی

- گیجی

عوارض غیر شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰۰ نفر):

- واکنش حساسیتی - درد قفسه سینه - استفراغ - بثورات پوستی - سوزش چشم  
- قرمزی چشم - درد چشم - دیدن جرقه های نور - حساسیت به نور - تند شدن ضربان قلب  
- بالا یا پایین رفتن فشار خون - درد عضلانی - خواب آلودگی - کاهش حس لامسه - سرگیجه  
- خون دماغ - وزوز گوش - خشکی دهان - التهاب سینوس ها - درد بالای شکم  
- بازگشت محتویات معده به مری (ریفلاکس) - وجود خون در ادرار - احساس گرما - خستگی

عوارض نادر (کمتر از یک نفر در ۱۰۰۰ نفر):

- واکنش حساسیتی پوستی - نعوظ طولانی یا دردناک - سنکوپ (غش) - تشنج - سکنه قلبی  
- ضربان قلب نامنظم - کاهش موقت جریان خون به بخش هایی از مغز - گرفتگی گلو - بی حسی دهان  
- خونریزی در پشت چشم - دوبینی - کاهش وضوح دید - احساس غیرطبیعی در ناحیه چشم  
- تورم چشم یا پلک - دیدن هاله نور - گشاد شدن مردمک چشم - تغییر رنگ سفیدی چشم  
- وجود خون در مایع منی - خشکی بینی - تورم داخل بینی - تحریک پذیری - کاهش یا از دست دادن ناگهانی شنوایی

#### هشدارها و موارد احتیاط:

- از رانندگی، کار با ماشین آلات یا انجام هر کاری که نیاز به هوشیاری دارد، تا زمانی که متوجه نشدید ویزارکت® بر شما چه تأثیری می گذارد خودداری کنید؛ به این دلیل که سیلدنافیل می تواند باعث اختلال در بینایی یا سرگیجه در برخی از افراد شود.
- در صورتی که اختلال نعوظ ندارید، از ویزارکت® استفاده نکنید.
- سیلدنافیل را نباید بیش از یک بار در روز مصرف کنید.
- این دارو را همزمان با داروهای خوراکی یا موضعی دیگر در درمان اختلال نعوظ استفاده نکنید.
- در صورت از دست دادن بینایی، مصرف سیلدنافیل را قطع کرده و بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت بروز علائمی مانند درد قفسه سینه و حالت تهوع حین رابطه جنسی، از پزشک خود کمک بگیرید.
- در صورت مصرف بیش از حد این دارو، با پزشک خود تماس بگیرید یا فوراً به نزدیک ترین اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.
- در صورتی که مدت زمان نعوظ بیش از ۴ ساعت طول کشید، به پزشک خود اطلاع دهید.
- مصرف ویزارکت® در کودکان زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.

#### تداخلات دارویی:

- در صورت مصرف داروهای زیر، پیش از شروع درمان با پزشک خود مشورت نمایید:
- داروهای نیترات آلی (مانند نیتروگلیسرین و ایزوسورباید دی نیترات):
- آمیل نیتريت؛
- ریوسیگوات؛
- مهارکننده های پروتئاز (مانند آتازاناویر و ریتوناویر)؛
- ساکویپتریل/والسارتان؛
- داپوکستین؛
- داروهای مهارکننده آلفا (مانند ترازوسین و تامسولوسین)؛
- اریترومايسين؛
- اکس کاربازپین؛
- فنوباربتال.

#### نحوه نگهداری:

- این دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور، رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- از مصرف این دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه خودداری کنید.
- این دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

این دارو باید حتماً با تجویز پزشک مصرف شود. از در اختیار قراردادن دارو برای آشنایان، حتی در صورتی که علائم مشابه شما را دارند خودداری کنید؛ زیرا ممکن است برای ایشان آسیب زا باشد.

شرکت دارویی اکتوورکو، کرج، ایران

